

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Basel
(Direktor: Professor Dr. R. Stähelin)

Ueber das Züchtungsverfahren der Tuberkelbazillen nach Petroff und nach Hohn

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

UNIVERSITÄT BASEL

vorgelegt von

Morduch Benski

aus Wilna (Polen)

Imp. Schneider - Saint-Louis - 1929

Ueber das Züchtungsverfahren
der Tuberkelbazillen nach
Petroff und nach Hohn

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät


der

UNIVERSITÄT BASEL

vorgelegt von

Morduch Benski

aus Wilna (Polen)



Von der Medizinischen Fakultät Basel genehmigt
auf Antrag von
Professor Dr. R. Massini



Tag der Promotion: 10 Juli 1929

Basel den 16. Juli 1929

Prof.Brückner
Dz. Dekan.

Ueber das Züchtungsverfahren der Tuberkel- bazillen nach Petroff und nach Hohn

Zur Vermehrung der Tuberkulose Bazillen bis jetzt die mikroskopische Untersuchung des Ausstriches, so auch Zählungsergebnisse mit Nadelzange oder Apparat und der Flüssigkeit verwandt. Die kulturelle Infektion des Meerschweinchens bleibt die wichtigste Methode zur Diagnosestellung, wenn das Zählverfahren keine spezifischeren Nachweisen vermag.

Schon Robert Koch und andere Forscher waren bemüht, auch bei Tuberkulose eine Zählungsmethode wie bei andern pathogenen Keimen (Typhus, Cholera, Diphtherie und andere) als Mittel zur Diagnose zu verwenden.

Auf das langsame Wachstum der Tuberkulosebakterien und die schnelle Verunreinigung der Kulturen durch andere Keime, die sich in der Nadelzange oder im Apparat befinden, wurde von Hohn (1913) zur Zählung der Tuberkulosebakterien (T. B.) vorgeschlagen. Da sie aber praktisch wenig brauchbar sind, ergab sich bei der Arbeit nicht.

Am besten hat sich das Hohnverfahren bewährt, es enthält die meisten Zutatensorten: Kalkmilch, Lactose und Phosphat, die die Entwicklung und das Wachstum des Mykobakteriums fördern.

Im Jahre 1913 wurde von Fernald, Haggan, Rosenbaum und Sorge ein Nährmedium zur Kultivierung aufgestellt. Das Verfahren verlangt keine Verdünnung. Insekten und Pupillen verwenden als Substrat von Hohnen mit Zusatz von Kalk und etwas Zuckersäure. Ein Medium aus Hohnen und Glycerin ist erst verwendet worden, als die Kulturen, die von Löhnen verbessert wurde. Wasser und Farnbach empfahlen ein Substrat aus Kalkmilch.

Zur Vermehrung der Mykobakterien bei zu langsamen Wachstum haben Hohnen, Rosenbaum, Simon und andere Kulturen verwendet.

Im Jahre 1915 hat S. A. Petroff einen Nährmedium mit Zusatz von alkoholischer Harnsäurelösung (1 : 10000) hergestellt. Die ~~zusätzliche~~ Flüssigkeit soll durch das Harnsäuremedium im Wachstum beeinflusst werden, ohne die T. B. in ihrer Vitalität zu schädigen.

Zur Abtötung der Mykobakterien im Sputum verwendet Petroff 15-20 Minuten lang 2% Natriolauge bei 70°C. und neutralisiert mit Salzsäure. Kelly, Mitchell und Simons und



Meinen Eltern in Dankbarkeit gewidmet
Prof. Dr. R. Meisinger

Digitized by the Internet Archive
in 2026

VEREINIGTE
BIBLIOTHEK
LEIPZIG

Tag der Präsentation: 10. Juli 1900
Baujahr: 1899
Produktion: 1900
Dr. Thacker

Ueber das Züchtungsverfahren der Tuberkelbazillen nach Petroff und nach Hohn

Zur Feststellung der Tuberkulose wurden bis jetzt die mikroskopische Untersuchung des Ausstriches, ev. nach Sedimentierung mit Natronlauge oder Antiformin und der Tierversuch verwendet. Die künstliche Infektion des Meerschweinchens bleibt die sicherste Methode zur Diagnosestellung, wenn das Ziehlpräparat keine spezifische Erreger nachzuweisen vermag.

Schon Robert Koch und andere Forscher waren bemüht, auch bei Tuberkulose eine Züchtungsmethode wie bei andern pathogenen Keimen (Typhus-Coli Gruppe, Diphtherie und andere) als Mittel zur Diagnose zu verwenden.

Aber das langsame Wachstum der Tuberkelbazillenkolonien und die schnelle Verunreinigung der Kulturen durch secundäre Flora ermöglichten keine praktische Verwendung. Es wurden verschiedene organische Stoffe tierischen und pflanzlichen Ursprungs zur Züchtung der Tuberkelbazillen (T. B.) vorgeschlagen. Da sie aber praktisch wenig brauchbar sind, erwähne ich sie in der Arbeit nicht.

Am besten hat sich die Hühnerei bewährt. Es enthält die nötigen Substanzen: Aminosäure, Lecithine und Phosphate, die die Entwicklung und das Wachstum des Virus fördern.

Im Jahre 1903 wurde von Fischel, Hueppe, Besançon und Sörgo ein Nährmedium aus Hühnereiern mitgeteilt. Das Verfahren fand keine Verbreitung. Besredka u. Jupille verwendeten ein Substrat von Bouillon mit Zusatz von Eigelb und Eiweiss, Zechnowitzer ein Medium aus Hühnerei und Glycerin. Dorset verwendete wieder den Eiernährboden, der von Lubenau verbessert wurde. Weise und Fernbach empfahlen ein Substrat aus Eigelbwasser.

Zur Vernichtung der Mischflora im zu untersuchenden Material haben Churchmann, Simon und andere Anilinfarbstoffe verwendet.

Im Jahre 1915 hat S. A. Petroff einen Eiernährboden mit Zusatz von alkoholischer Gentianaviolettlösung (1:10.000) hergestellt. Die secundäre Flora soll durch das Gentianaviolett im Wachstum beeinflusst werden, ohne die T. B. in ihrer Virulenz zu schädigen.

Zur Abtötung der Begleitbakterien im Sputum verwendete Petroff 15-30 Minuten lang 3 % Natronlauge bei 38° C. und neutralisierte mit Salzsäure. Keilty, Mitchell und Simons und

andere prüften das Verfahren und erzielten gute Resultate.

Die Bereitung des Nährbodens nach Petroff wird in unserem Laboratorium folgendermassen ausgeführt.

100 gr. gehacktes Rindfleisch werden mit 100 gr. 15 % Glycerinwasser vermischt, 24 Stunden lang im Eiskasten stehen gelassen und in steriler Presse ausgepresst. Dann werden 6—7 im Alkohol desinfizierte Eier in einem Becherglas aufgebrochen, mit Glasperlen heftig durchgeschüttelt, und in einem sterilen Zylinder koiiert. Zwei Teile Eier, ein Teil Fleischsaft und 1 % alkoholische 10%ige Gentianaviolettlösung (=1:10.000), werden bis zur Entstehung einer homogenen Emulsion gut durchgeschüttelt, je 5—6 ccm in sterile Reagensröhrchen verteilt und diese mit Wattezapfen versehen. Die Röhrchen werden auf einem Metallgestell schräg aneinander gelegt und im Dampftopf bei 85° C bis zur Erstarrung erhitzt. An den darauffolgenden zwei Tagen werden sie in derselben Weise bei 75° C je 25 Minuten lang sterilisiert. Dann wird zu jedem Röhrchen 0.8 ccm. natursaurer Bouillon hinzugefügt und dann mit von Parafin durchtränkten Wattestopfen abgeschlossen.

Loewenstein und Sumiocyhi gelang es nachzuweisen, dass die T. B. bei Zusatz von 20 %, ja sogar 30 % Schwefelsäure zum zu untersuchenden Material bei einer Stunde langer Einwirkung noch ihre Vitalität beibehalten. Die begleitenden Keime gehen schon bei 10 % Schwefelsäure Einwirkung zugrunde. Loewenstein u. Sumiocyhi benutzten feste Kartoffelnährböden mit Glycerinzusatz. Sie behandelten 200 ccm. um tuberkulosem Sputum mit 10 ccm. 15 % Schwefelsäure, Salzsäure usw. und wuschen dann zweimal mit physiologischer Kochsalzlösung. Surany und Putnoky prüften diese Versuche an Sputum und erhielten mit einer fünffachen Menge 25 % Schwefel- und Salzsäure bei 15 Min. langer Einwirkung optimale Resultate. Pesch und Simchowitsch benutzten 1 ccm. 20 % Schwefelsäure zu 20 ccm. Sputa.

Hohn modifizierte das Kulturverfahren mit dem Lubenau'schen Eiernährboden. Auf Grund seiner Untersuchungen kommt Hohn zum Schluss, dass der Nährboden, einfach bequem und für das klinische Laboratorium brauchbar ist.

Die Technik wird folgendermassen ausgeführt: Zwei ccm des zur Prüfung nötigen Materials werden in einem sterilen Zentrifugenglas mit 10—12 ccm. 10 % Schwefelsäure bis zur Entstehung einer homogenen Masse geschüttelt, 20 Minuten lang schräg liegen gelassen und 5—10 Min. lang zentrifugiert. Die überstehende Flüssigkeit wird abgossen. Das Sediment wird ungewaschen auf 3—4 Röhrchen ausgestrichen,

welche schräg erstarrte Hühnerei-Clycerin Bouillon mit künstlichem Kondenswasser enthalten. Schliesslich werden die Röhrchen vor Feuchtigkeitsverlust durch paraffinierte Wattestopfen geschützt und bei 37° C. bebrütet.

(Genaue Herstellung des Hohn'schen Verfahrens siehe Münch. med. Wochenschrift 1926, Nr. 51).

Als Haupterfordernis dieses Verfahrens gibt Hohn folgende Bedingungen an:

- „ 1) Verwendung frischer Eier.
- „ 2) Zusatz von natursauer Bouillon.
- „ 3) Gute Erstarrung, spiegelglatte Oberfläche
- „ 4) Zufügung von künstlichen Kondenswasser
- „ 5) Guter Verschluss mit Ceresinzellstoffstopfen.

Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass das zu untersuchende Krankenmaterial, ohne neutralisiert zu werden, direkt verimpft werden kann. Die Erklärung sucht Hohn darin, dass der Säurerest einerseits von dem Eiweiss gebunden, und dass andererseits das Wachstum der T.B. durch die Säure angeregt wird.

Die Hohn'sche Modification wurde von Schrader, Engel, Fr. Schmidt, Sonnenschein, Sütterlin, Hauptmann und Burtscher, Meller und Dimtza geprüft. Sie erzielten gute Resultate und empfahlen das Verfahren als Ergänzung der klinischen Hilfsmittel bei Tuberkulosenverdacht. Dagegen wurde von E. Hermann das Antiforminverfahren von Uhlenhuth dieser Methode als überlegen angesehen.

Die Züchtungsversuche begannen wir in der Weise, dass wir die Eiernährböden nach Hohn u. nach Petroff verglichen. Als Untersuchungsmaterial benutzen wir Sputa, Urinsedimente, Punktate (Eiter, Ascites, Pleuraexsudate und Liquor) Blut und Sektionsmaterial.

Zur Erstarrung und Sterilisierung der Eiernährböden benutzten wir auf unserm Laboratorium den Dampftopf. Die Röhrchen mit dem Nährsubstrat werden auf ein Metallgestell schräg gelegt und im kalten Dampftopf abgeschlossen, dann bis 84° C. erhitzt und 15 Minuten lang steigend bis 87° C. auf kleiner Flamme gehalten; 87° C. dürfen nicht überschritten werden. Wir erzielten dadurch, dass die Gesamtfeuchtigkeit im Nährboden drin bleibt.

Es soll hier zuerst eine Gesamtübersicht der untersuchten Proben mit den klinischen Untersuchungen, Ausstrichbefund, Diagnosen ev. Sektion angegeben werden. Aus wirtschaftlichen Gründen war es nicht möglich, alle Kulturen mit dem Tierversuch zu vergleichen. Es wurden nur in Verbindung mit einigen Züchtungen Meerschweinchen infiziert. Der Untersuchung des Ausstriches im Mikroskop wurde grösste Sorgfalt gewidmet.

Legenda

+	= positiv	S.	= siehe
—	= negativ	K. Ur.	= Katheter Urin
x	= mal	E.	= Eintritt
Sp	= Sputum	W. E.	= Wiedereintritt
haem	= haemorrhagisch	A	= Ausstritt
o	= ohne	+1	= vereinzelte T. B. im Ge-
T. B.	= Tuberkelbazillen		sichtsfeld
†	= Exitus	P.p.	= Pleurapunktat
Tbc	= Tuberkulose	L. P.	= Lumbalpunktat
tr.	= vertrocknet	Mee	= Meerschweinchen
v	= verunreinigt		

Die Zahlen in den Rubriken „Kulturelles Verhalten“ = Wachstum in Tagen.



No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr. 10 o/o	Petr. 5 o/o
1.	Sie S.	Kniegelenk- punk.	—	10 11 27	- 30	tr.	tr.
2.	Wa. M.	Pleurapunk.	—	12 11 27	—		
3.	Ha. Fr.	Sputum	-	19 11 27	- 21	tr.	
4.	Gla	Sputum.	-	19 11 27	- 21	- 21	
5.	Meers.	Inguin. Drüse	-	19 11 27	- 40	- 40	
6.	Bü. E.	Eiter	—	24 11 27	—		
7.	O. M.	Pleurapunk.	—	25 11 27	—	tr.	
8.	Gr. H.	Sputum	—	25 11 27	—		
9.	Ho.	Sputum	—	25 11 27	—	tr.	

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionsbefund

Tbc. der Lunge, Darmes Larynx und linkes Kniegelenk
Sp. + T. B. † 12 XI 27.

Chron. Lungentbc. mandelgr. Kav. in der Spitze. Schwere Pleuritis. Konfl. azin. nod. Tbc. des linken Lap., Tbc. des ganzen Darmes. Schwere fungöse Tbc. des linken Kniegelenks.

2 x Sp + T. B.; Hydroth. eks. dextr. † 6 I 28.

Serös-Hämorrh. carcin. doppelseit. Pleuritis von der rechten Mamma ausgehend.

E. 11 X 27. 7 x Sp + T. B. — Tbc. pulm. (chron. Bronchitis) Austr. 17 XII 28 W. E. 23 III 4 x Sp. + T. B. noch im Spital. (S. Nr. 38).

E. 27 IV 27. 5 x Sp. + T. B. — 1 VIII. o T. B.; 3 x Sp. + T. B.: Tbc. pulm.

1,5 ccm Lungenaufschwem v Giraffe subc. Mee. 13 X 27 geimpft; Mee † 18 X 27; (S. Nr. 19, 30, 31).

Tbc. der Lungen, Milz, Leber Drüsen, Mikr.: T. B. +

E. 19 VII 27; 5 x Sp o T. B. 24 XI. Empy. Eiter o T. B. 1) Bronchial Ca rechts, 2) Pleuraempym. † 22 XII 27.

Wallnussgross Ca. d. recht Unterlappens; Bronch.; mehrerer gangr. Höhlen d. r. Unterlappens. Alt. Durchbruch in die Pleurahöhle mit schwart. Empyem

E. 18 VIII. Bronchopneum, u. Pleur. exs. sin. 5 I 28. W E. im Hilfsspital 14 V. 11 VI 28 geheilt

E. 8 XI 27; 8 x Sp o T. B.
1) Pneumonia migrans.
2) Lungenoedem. Austr.
5 XI 28 (in Heilung)

E. 21 VII 27; 4 x Sp o T. B. Bronchitis; geheilt; A. 8 XII 27

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Veimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr. 100/o	Petr. 50/o
10.	Cl. N.	Urinsedim	- -	26 11 27	- -(14)		
11.	Hä L.	Pleurapunkt.	—	26 11 27	—		
12.	Re. L.	Sputum	- -1)	1 12 27	- -(51)	tr.	
13.	Hu.	Sputum	—	3 12 27	—		
14.	Ne. A.	Kathed.-Urin.	- -1	3 12 27	—		
15.	Wi	Kathed.-Urin.	—	3 12 27	—		
16.	St. Ch.	Pleurapunkt.	—	5 12 27	—		
17.	Ni	Sputum	- -1	5 12 27	- -(18)		

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionsbefund

E 18 XII 27; 2xK Ur o T.B.
dann 2xK Ur + T. B.

1) Cor adipos. 2) Nierentbc
3) Pleur. sic. sin; Lungenabs-
zess. 2xK Ur + T.B. im August
Spondylitis Tbc. † 30 VIII 28

Tbc. pulm 12xSp o T.B.; 25
XI. P. p. nach 15' suchen T.B.
vereinzelnd. Austr. unverän-
dert nach Davos 15 II. 28

Pleur. exs. dextr. cavern
zirhot, Lungentbc. 10xSp o T.
B.; 1 XI Sp + T. B.; 18 XI
Sp haem. o T.B.; 21 XII o T.B.
Austr. 12 I 28 W. E. 21 III
sp haem. -+ T.B. † 5 IV 28.
(S. Nr. 19)

E. 10 XI 27; 14xSp o T. B.;
15 XI + T. B. daun 3xSp o
T.B. Thrombophlebitis. Geheilt
A. 31 XII 27.

5xK Ur. o T. B.
Pyelocystitis. geheilt.

E. 10. XII 27. 3 XII Ur, o
T. B. Antiformin o T.B.; Go.
d. Cervix mit begin. Ascension
Spina Ventosa, 7 XII 27 ver-
legt nach Frauenspital.

2xhaem. Sp o T.B.; 27 XI Sp
+ T.B.; 3xSp + T.B. 1) Tbc. pul-
monum 2) Pneumonia caseo-
sa. † 14 XI 28 (S. Nr 41.)

E. 24 II 27; 2xSp o T. B. 5
III 27: Sp -+ T. B.; Besserung
Austr. 26 III 27 W. E. 24 III
25 6xSp + T.B.; 19 I 29 Sp
o T. B; 3xSp + T.B. 1) Tbc
pulmon. 2) Tuberk. Lympho-
me am Halse. † 28 IV 28.

Käsige Pyonephrose links; :
Tuberkei-Zerstörung des 12.
Th. — Wirbels; daselbst Pa-
ravertebralabszess, spärli, Mi-
liartbec. d. Lunge, Leber,
Herz und Nieren. Frische
diff. Peritonealtbc.

Chron. Lungentbc. Schwart.
Pleuritis der rechten Lunge

Akute Lungentbc. Pneum. ca-
seosa des linken Lappens.
Pleuritis Tbc. sic. dex: begin-
ulcerierende Darmtbc.

Chron. Lungentbc. Kavern.
im rechten Oberlappen. Käsi-
ge lymph. und. peribronch.;
Tbc. des rechten Unterlap-
pens schwart. Pleuritis; ulc.
Tbc. im Darm; Miliartbc. der
Milz und Leber

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr 100/o	Petr. 5 o
18.	Ha. M.	Urinsed	—	6 12 27	—		
19.	Re.	Sputum	—	10 12 27	—		
20.	Bi	Sputum	—	10 12 27	—	—	
21.	Ne. A.	Kathed-Urin.	—	10 12 27	—	—	
22.	Tho. G.	Ascites	—	12 12 27	—	—	
23.	Ba. E.	Pleurapunk.	—	14 12 27	—	—	
24.	Ba. E.	Pleurapunk.	—	15 12 27	—	—	—
25.	Mi.	Sputum	- *	15 12 27	-		- (30)
26.	Me.	Sputum	-	16 12 27	- (25)	- (25)	
27.	Me.	Sputum	+	16 12 27			+(35)
28.	Wa.	Sputum	+	17 12 27	+(34)		+(34)
29.	Kaninch.	Inguinal drüse,	—	27 12 27	+(70)		
30.	Kaninch.	Lunge	+	22 12 27	+V(60)		
31.	Kaninch.	Peritoneum	—	23 12 27	—		

*) nach 10 Minuten suchen —8 Stäbchen.

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionbefund

E. 5 XII 27 4xSp o T. B.; 5
XII 27 K. Ur o T. B; Tbc
incipiens. Besserung, Austr. 16
XII 27.

S. Nr 12

E. 2. XII. 27 2xSp o T. B.
Septisch. Abort. Pyelocystitis
Austr. 20. II. 28.

S. Nr 14

E. 27 X 27 5xPeriton Punkt o
T.B.Laen'sche Lebercirrhose.
noch im Spital.

4xSp o T. B. Pleuritis exs.
dex. geheilt. (S. Nr 24).

S. Nr 23

E. 14 XI 27; 2xSp + T. B.
unverändert, Austr. 17 XII 27

1xSp o T. B. dann 7xSp +
T. B; Lungen und Darmtbc.
(S. Nr 27) +

Chron. Lungentbc. Ulcer
Tbc. des untersten Ileums,
des Append., Dickdarms, Gal-
lengangtbc. der Leber.

S. Nr. 26

E. 15 IX 27; 6xSp + T. B.;
Tbc. pulm. gebessert; 22 XII
27 nach Davos.

{ Lungenaufschwem. v. Giraff
(13 III 27) 2 ccm subcut, am
13 X 27 Kaninchen injiziert;
Kan. + 13 XII 27. S. auch Nr 5

An der Inguin, Gegend bei-
derseits erbsengrösse Drüs-
sen; Leber o. B. Lunge von
kleinen Knötchen durchsetzt.
Herz gross sonst o. B.

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr 10o/o	Petr.5
32	Wö.	Kath. Urin.	—	22 12 27	—	—	
33.	Ha. Myr- tha.	Pleurapunk.	—	23 12 27	—		
34.	Böd Rud.	Sputum	+	24 12 27	+(20)	-1-(20)	
35.	Schw.	Sputum	+	27 12 27	+(20)	+(20)	
36.	Tho. Heinr.	Sputum	+	27 12 27	+(20)	-1-(20)	
37	Gr. † 1)	Herz, Leber, Niere.	—	27 12 27	—		
38.	Ha.	Sputum	+	28 12 27	+(19)	-1-(19)	
39.	Ka.	Leber	—	13 12 27	+(60)	-1-(60)	
40.	Ro.	Abszess-Eiter	—	29 12 27	—	—	
41.	Sta	Sputum	+	29 12 27	+(22)	-1-(22)	

1) Tierversuch; Tbc (—)

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionsbefund

E. 4 XII 27: 3x Sp o T. B.
1) Angina cathar. 2) Colit
mucosa rezid; Austr. 22 III
28. Geheilt.

7xSp o T. B. Pleur. exsud;
gebessert. A. nach Davos 17
II 28

4xSp + T. B; Tbc. pulm.
unverändert. Austr. 15 II 28

17 XII 27; Sp o T.B. 19 XII
Sp + T. B. dann 3xSp o T.
B.; Fibrö-cavernöse Lungen-
tbc. unverändert. Austr. 10
III 28.

I. E. 7 IV 27; 5xSp + T. B;
1) Phthisis pulm.
2) Pleur. exsud. dex. (Schwarte)
Austr. 25 V 27; W. E. 28 II.
27; 4xSp + T. B; W. A. 22
II 28. III E. 27 II; 3xSp +
T. B. verschlechtert; W. A.
3 X 28.

E. 15 XII 27. 1) Bronch.
chron. 2) Insuf. mitr. 3) Ulc.
ventr. † 26 12 27.

Tbc pulm. S. Nr 3.

S. Nr 29, 30 und 31.

6xSp o T.B. 27 I Sp + T.B.,
dann 9xSputum o. T. B. 19
III 28 Stuhl + T. B. 4xSt. o.
T. B. 27 XII 27 Absz. Eiter
o. T. B.; Tbc. pulm. Darm
Tbc. Besser. Austr. 10 4 28.

S. Nr 16.

Chron. Stauung der Organe
Verwachs. der linken Lunge.
Chron. Emphysem.

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr 10o/o	Petr.5 o/o
42.	We	Sputum	—	3 1 29	—	—	
43.	Me.	Kathr. Urin	—	3 1 28	—	—	
44.	Di.	Pleurapunk	—	2 1 28	—	—	
45.	Gre.	Liquor cer.spin.	+	4 1 28	+(25)		
46.	Na.	Sputum	+	6 1 28	+(15)	-1-(15)	
47.	In.	Sputum	—	7 1 28	—	—	
48.	Le.	Sputum	+	9 1 28	+(17)	+(17)	
49.	Do.	Sputum	+	11 1 28	+(25)	—	
50.	Sche.	Sputum	+	12 1 28	+(25)	+(25)	
51.	Hä.	Spntum	+	14 1 28	-1-(60)	-1-(60)	
52.	Fla.	Sputum	—	16 1 28	—	—	
53.	Sche.	Sputum	+	17 1 28	-1-(22)	-1-(25)	

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionsbefund

30 12 27. Sp o T.B. Pankreas
Ca. † 19 1 28

Mannskopfgrosser Ca. des
Pankreaskopf, mit Einbruch
in Dünndarm.

Arthrit rheum. 2. Pleuritis sic
Austr. in Heilung 1 3 28.

2xP.p. o T.B. Pleurit. exs. (Me-
diast. Tumor?) Besser Austr.
2 II 28.

4 I. Liquor † T.B.; 6 1 Ur o
T. B.; Mening. Tbc; Tbc pulm.
otitis media tuberc. † 8. 1 29.

Tuberc. basil. Meningitis bei
mässig allg. miliar Tbc.;
chron. Kav. Phthise beider
Lungen,

4xSputum † T.B.; 4xUr. o. T.
B. Tbc. pulm. Dextr. Pneumoth.
Artit. dextr. Besserung nach
Davos.

E. 4 1 28. 14xSput. o. T.B.
Pneum. chron. Geheilt Austr.
1 3 28. (S. No. 56).

E. 5 1 28. 3xSp. † T.B. Tbc.
pulm. Unverändert. Austr. 15
3 28.

E. 9 1 28. 4xSp. † T.B., Tbc.
pulm. Verschlechtert, Austr.
14 3 28.

E. 9 1 28. 4xSp. † T. B., Tbc.
pulm. Oditis med. chron.
Gebes. Austr. 14 6 28.

5xSp. † T. B.; Tbc. pulm. dex-
tra; Besserung. Austr. 20 2 28.

E. 11 1 28. 4xSp. o. T.B.
Aethylism. chron. Bronchit.
akuta. Austritt unverändert 26
1 28. W. E. 30 3.

11xSp. o. T.B. unverändert,
Ausstritt 30 4 28

S. No. 50

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr 100/o	Petr.5 o/o
54.	Sche.	Sputum	-	17 1 28			+(22)
55.	Sü.	Ascites	—	17 1 27			—
56	In.	Sputum	—	27 1 28	—	V	
57.	Pr.	Sputum	+	20 1 28			+(18)
58.	Pr.	Sputum	+	24 1 28	- 15	- 15	
59.	Fi.	Sputum	+	26 1 28	+25	+25	
60.	Fi.	Sputum	+	26 1 28			—
61.	Ho.	Sputum	—	26 1 28	—		
62.	Me.	Sputum	+1	28 1 28	V.		- 20
63.	Pa.	Sputum	+	31 1 28	- 45	+45	
64.	Me.	Sputum	—	3 2 28	—	—	
65.	Chr.	Sputum	—	3 2 28		—	
66.	Me.	Sputum	+	3 2 28	- 22	- 22	
67.	Sü.	Acites	—	5 2 28	—	—	

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionsbefund

S. No. 50

E. 10 1 28. Zweimal Stuhl + Chron. Lungen Tbc.; Tbc. de
T.B.; Lungen u. Darm Tbc. Periton. in Douglas. Ulzer.
† 23 1 28. (S. No. 67) Darmtuberc.

S. No. 47.

E. 17 1 28 4xSputum + T. B.;
Tbc pulmon. vorn rechts. Bes-
ser. Austr. 1 3 28.

S. No. 57

E. 20 1 28 2xSputum + T.B. Chron. Lungentbc. Schrump-
Tbc. pulm. † 22 2 28 (S. No. fung d. linken Lunge bei alt.
60). Kaverne, Phthise beider Lap-
pen. Schiefe Vernarbung und
Verödung der Spitze & Hilus.;
Tbc. schwart. Pleuritis; chron.
periton Tbc; Ulzer, Larynx &
Darm Tbc

S. No. 59.

9xSp o T.B.; Pneumonia crou-
posa d. recht. Unterl. Geheilt. (S.
No. 73).

E. 18 1 28: 2x Sp o T. B. 21.
1. + T. B. dann 3xSp. o. T. B.
Tbc fibrosa d. rechten oberen
Lungenfeldes; (S. Nr 66).

3xSp. + T. B.; 5x St. + T. B; Chron. Lungentbc. Pleuritis d
Lungen und Darm Tbc. Herz- linken Seite u. recht. Oberlap-
insuffizienz. † 22 3 28 (S. No. 71) pens; schw. chron. Ulzer. Tbc
d. Coecums & Perityphlitis.

E. 1 2 28; Myodegener. cordis,
Coronarsklerose, Mesaoritis.
luetica, † 24 3 28. S. No. 81).

E. 10 1 28. 7xSp o. T. B.
1) Bronch. acuta, 2) Tbc. pulm.
Besser. Austr. 1 2 28.

S. Nr 62.

S. Nr 55.

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr. 10 o/o	Petr. 05
68.	Ga.	Pleurapunk.	—	6 2 28	—	—	
69.	Hä.	Sputum	+	6 2 28	+(19)	-(19)	
70.	Pa.	Sputum	+	9 2 28			+
71.	Kne.	Urinsedim	—	11 2 28	+28	+(28)	
72.	Fu.	Sputum	—	13 2 28	V	—	
73.	Ho.	Sputum	—	13 2 28	V	—	
74.	Du.	Uurinsediment.	—	13 2 28	+35	-(35)	
75.	Thü.	Urinsediment.	—	13 2 28	—V.		
76.	Ehr.	Sputum	+	17 2 28	+35	-(35)	
77.	Gu	Pleurapunk.	—	14 2 28	—	—	
78.	Ehr.	Sputum	+	13 2 28	V.		+ 23
79.	Kai.	Sputum	—	18 2 28	—	—	
80.	Me.	Pleurapunk	—	25 2 28	V.	—	
81.	Me.	Sputum	—	3 2 28			—

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionbefund

Tbc. pulm. dextr, Einmal Sp o.
T.B. Besser. A. 17 4 28.

5xSp + T.B; Tbc. pulm. dextr.
Besser. A. 28 2 28 S. No (51).

S. No 63

E. 6 2 28 4xK. Ur. o T.B. Cys-
titis (Spät. auf Grund d. Kultur.
Tbc renal.) A. Unverändert. 28
2 28.

3xSp o T.B.; Myocarditis, An-
gina pectoris. Gebessert. A. 13
2 28,

S. No. 61.

E. 26 9 27 4xSp o T.B, 21 1 28.
K. Ur. o. T.B.; 5 2 K. Ur. +
T. B., 27 2 K. Ur +T.B. Peri-
ton. Tbc. Pleuritis sicca, Cysti-
tis Tbc.; Gebes. A. 5 6 28.

E. 3 2 28. 6xK. Ur.o.T.B.; Rect.
Ca (Basedow) 25 2 28.

E. 8 2 28. 2xSp + T.B.; Tbc.
pulm.; Besser. A. 12 4 28. (Da-
vos) (S. No 78).

E. 16 1 18. 3xTp. o.T.B.; Ca d.
Pankreaskopfes, Metast d. recht
Bronch. Lues. † 11 3 28.

Mesaorti.luetica.kleiner prim-
Ca, d. Pankreask. (ohne Me-
tastasen.)

S. No 76.

E. 23 2 28 1xSp. o T. B.; Pleu-
rit. sicca dupl. A. 24 3. Geheilt.

E. 14 1 28. 5xSp. o. T.E. 25 1
Sp. + T. B., 2xSp. o. T.B. (vor
Spital E. T. B. gefunden) Tbc.
pulm. prod. d. recht. Spitze;
Besser. A. 14 3 28.

S. No. 64.

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten			
					Hohn	Petr	10o/o	Petr.5
82.	Be.	Sputum	—	25 2 28	V	—		
83.	Kü.	Sputum	—	5 3 28	—	—		
84.	Bre.	Sputum	—	6 3 28	—	—		
85.	Trö.	Sputum	—		V	V		
86.	Hu.	Sputum	+	12 3 28				- -25
87.	Alt.	Sputum	+	12 3 28				- -25
88.	Cu	Sputum	—	12 3 38			- -27	
89.	Cu.	Sputum	—	12 3 28				- -22
90.	Zu.	Liquor	- -1	20 3 28	- -20			
91.	Schn.	Sputum	+	26 3 28				- -13
92.	De	Sputum	—	26 3 28	—	—		
93.	Am. ¹⁾	Pleurapunkt.	+	27 3 28	V	—		
94.	Wo.	Empyemeiter	+	4 4 28	V	V		

1) Tierversuch : Tbc.(-|-)

2) „ † 2 Tage n. d. Injektion.

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionsbefund

E. 22 28 3xSp o. T. B.; Ca Hepatis + 21 5 28

5frankenstückgross Ca. klein. Curv. d. Magens. Metastasen in d. Leber. Retroperitonealdrüsen & Hilusbifurkationsdrüsen.

E. 19 1 28. 16xSp o. T. B. Hypertroph. Leberzirrh. Tbc pulm. prod, rechtsseitiger Spitzprozess); W. E. 10 5 28.

9xSp o. T. B.; Bronch. Tbc.; Austr. 30 3 28 in Sanatorium

E. 15 2 28. 7xSp o. T. B.; 6xSt. o. T. B. Peronit. Tbc. A. 27 3 28.

E. 24 2 28 3xSp. + T. B.; Tbc. pulm. unveränd. A. 27 3 28.

E. 22 2 28. 7xSp + T. B.; Tbc. pulm. sin. Gebess. A. 15 5 28.

E. 9 3 28. 9 5 Sp. o. T. B.; 10 3 Sp. + T. B.; 13 3 Sp. + T. B.; K. Ur o. T. B. 15 3 St. + T. B.

E. 19 3. Stuhl o. T. B., Tbc. pulm.

E. 17 3 28. 17 3. Lumb. Punkt. - - T. B. (4 St.) 19 3. L. P. (2 St.) + T. B. Meningitis Tbc. + 19 3 28.

Basilarmeningitis Tbc. bei frisch. Miliar Tbc. sämtl. Org. aus d. recht Mittellapen ausgehend. Käsige Tbc. der Hiluslymphdrüsen.

E. 19 3 28 2 xSp. + T. B.; 1xSt. + T. B. Tbc. pulm. & laryngys, + 31 3 28.

Chron. Lungentubek, Caverne d. rechten Oberlappens. Tuberk. Ulz d. Stimmbänder.

E. 12 3 28. 11xSp o. T. B.
1) Traumat. Pneumonie. 2) bei fibröser Lungentbc. 1) Geheilt; 2) Unveränd. A. 26 4 28

E. 23 3 28. 1xSp o. T. B.; 1xPl. p. o. T. B.; Tbc. pulm.; Pleur. exs. dextra.

E. 38 3 28; Sp. o. T. B.; dann Sp. + T. B. (1 St.) 1) Myodegener. cordis, 2) Pleuraempyem. 3) Diabetes melitus; + 9 4 28.

Schwart. Pleuritis d. Lunge m. Empyem b. Karnif. Pneum. eiter. Bronchitis; Frischer Aus-
saat v. mil. Tbc. auf d. serosa d. Bursa oment.

No.	Name	Material	Ziehl	Datum der Verimpf.	Kulturelles Verhalten		
					Hohn	Petr. 10 o/o	Petr. 5 o/o
95.	He.	Sputum	—	5 4 28	—	—	
96.	Wo.	Empyemeiter	—	10 4 28	—	—	
97.	Bre.	Drüseneiter	—	10 4 28	- -28	- -28	
98.	Ri. ¹⁾	Eiterabszess	—	17 4 23	- -20	- -20	
99.	Ri	Eiterabszess	—	17 4 28			- -16
100.	Sa.	Sputum	—	19 4 28	—	—	—
101.	Sa.	Sputum	—	19 4 28			
102.	We. ²⁾	Eiter v. Phlegm.	—	20 4 28	—	—	
103.	Ho. M.	Liquor	-	27 10 28	- -12		
104.	Ne H.	Ureth. Urin. (l)	—	18 6 28	+		
105.	Ne. H.	Ureth. Urin.	—	18 6 28	+		
106.	Kä M.	Blut	—	18 6 28	- -35		
107.	Bue. Ma. ³⁾	Pleurapunk	—	10 7 28	—		
108.	Bo. A. ⁴⁾	Sputum	—	17 10 28	+		

1) Tierversuch: -|- T. B.

2) „ — T. B.

3) Tierversuch T. B. -|-

2) „ T. B. -|-

Klinische Untersuchungen u. Diagnose

Sektionsbefund

E. 20 2 28 14xSp. o. T. B; Bronchial Ca. d. recht. Lunge (Hæmoptoe) †.

Bronchial carcinom.; Lungenabszess; Streptococcensepsis.

S. No. 94.

E. 4 4 28., 11 5. 1 St. gefunden, sonst 6xSp. o. T. B. Tbc. pulm. unverändert. A. 16 6 28.

E. 20 4 28., 13 4. Empyem 1 St. (T. B.) gefunden später o. T. B.

1. Senkungsabszess in d. Sacralgegend. 2. Diabetes melitus.

E. 3 4 28., 13xSp o. T. B.; Chron Pneumonie; Lungentumor rechts, gebessert. A. 25 4 28,

E. 22 3 28. Empyem o. T. B.; Phlegmone d. Armes. † 14 5 28.

Schw. allgem. Infekt. von Decubitus p. r Kreuzgegend ausgehend; Spitzennarben d. link. Oberlappens.

E. 23 10 28. Liquor: 7 Stäbch. nach 20' suchen; Meningitis Tbc. † 2 11 28.

Subacute Tuberk.-basil. Meningit. (o. allgem. Miliartbc. Chron. Tuberk. veoperitonitis m. Mastdarmfistel.

E. 2 4 28. 2 5. K. Ur. o. T. B.
26 5 Ur + T. B.; 14 6. Ur.
o. T. B.; Tbc. Nephritis & Salpingitis. A. 19 6 28 n. Davos.

E. 15 6 28. 16 6 Blut o. T. B.; Miliartuberkulose; A. 19 6.; † am 23 6 28. (zu Hause).

E. 16 7 28. 14x Sp. o. T. B. Pleurit. exs. sin Tbc. pulm.? A. 24 1 29 in Heilung.

E. 25 1 28. 11xSp. o. T. B. Tbc. pulm. prod. A. 15 2 29.

A. Sichere tuberkulöse Erkrankung

Untersuchungsmaterial	Total	Ziehl Neelson		Hohn		Petroff			
		positiv	negativ	positiv	negativ	10 o/o H ₂ SO ₄ positiv	negativ	5 o/o H ₂ SO ₄ positiv	negativ
Sputum a)	22	18	4	19	3(1-v)	19	3(1-v)		
„ b)	1	1		1			1		
„ c)	2	2		2				2	
„ d)	5	3	2	4	1				
„ e)	10	9	1					10	
„ f)	1	1							1
„ g)	1		1				1		
Urinsediment a)	2		2	2		2			
„ b)	3	1	2	3					
Pleurapunkt	1								
a) seröse	3		1		1				
b) haem.	3		3		3				
c) „	2		2				2		
Empyem	2		2		2(1-v)		2(1-v)		
Ascites a)	1		1		1		1		
b)	1		1						1
Drüseneiter	3		3	2	1	2	1		
Gelenkeiter a)	1		1	1					
b)	1		1					1	
Liquor	3	3		3					
Sektionsmat. a)	3	1	2	2	1	2	1		
b)	1	1		1					
c)	1		1						
Blut	1		1	1		1			

(1-v) = 1 Kultur verunreinigt

B. Zweifelhafte tuberkulöse Erkrankung

Untersuchungsmaterial	Total	Ziehl		Hohn		Petroff			
		positiv	negativ	positiv	negativ	10 o/o H ₂ SO ₄ positiv	10 o/o H ₂ SO ₄ negativ	5 o/o H ₂ SO ₄ positiv	5 o/o H ₂ SO ₄ negativ
Sputum	1		1		1		1		
Urinsediment	2		2		2		1		
Seröse Pleurapunkt	4		4		4		1		1
Ascites	1		1		1				

C. Keine tuberkulöse Erkrankung

Untersuchungsmaterial	Total	Ziehl		Hohn		Petroff			
		positiv	negativ	positiv	negativ	10 o/o H ₂ SO ₄ positiv	10 o/o H ₂ SO ₄ negativ	5 o/o H ₂ SO ₄ positiv	5 o/o H ₂ SO ₄ negativ
Sputum	18		18		12		12		2
Urinsediment	5	1	4		5		1		
Pleurapunktate							2		
a) seröse	3		3		3				
b) Empyem	1		1		1				
Drüseneiter	1		1		1				
Sektionsmaterial	1		1		1				

Tierversuche

Fall	Material	Klinische Diagn.	Ziehl-Neels.	Tierversuche	Kultur	
					Hohn	Petroff
2	Pleurap.	Hydroth. exsud. dextr.	—	—	—	—
7	Pleurap.	Bronchpneumonie & Pleur.exud sin.	—	—	—	—
12	Sputum	Pleu. exs. dextr.	- -	- -	- -	v
37	Sekt. Mat.	Bronch. chron.	—	—	—	—
93	Pleurap.	Tbc. pulm. pleur. exs. dextr.	—	- -	v	—
94	Empyemeit.	Pleuraempyem	—	† 2 Tage n. Inj.	v	v
98	Eiter	Senkungsabscess	—	- -	- -	- -
102	Eiter	Erysipel. Phlegmone d. Armes	—	—	—	—
107	Pleurap.	Pleu. exs. sin Tbc. pulm ?	—	- -	—	—
108	Sputum	Tbc. pulm.	—	- -	- -	—

Legenda ; v = verunreinigt. — = negativ, -|- = positiv † = Exitus

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden 108 Proben verschiedenen Ursprungs von 82 Fällen nach den Methoden von Petroff (mit 10 % und 5 % Schwefelsäure Vorbehandlung, ohne zu neutralisieren) und von Hohn untersucht.

Von diesen Proben stammen:

- A. 71 von sicher tuberkulösen Fällen
- B. 8 von zweifelhaft tuberkulösen Fällen
- C. 29 von Fällen ohne klinisch nachweisbare Tuberkulose.

A. von den 71 Fällen von klinisch sicheren Tuberkulösen ergaben sich bei 40 Proben im Ausstrich T. B. und in den übrigen 31 keine.

I. Von diesen 40 Ziehl-positiven Proben wurden geprüft:

- a. nach Petroff (mit 5 % H_2SO_4 Vorbehandlung) — 10.
Alle Kulturen mit Ausnahme von einer (Nr. 60) waren positiv.
- b. nach Petroff (mit 10 % H_2SO_4 (Vorbehandlung) und nach Hohn — 20. In je 19 Kulturen wurden T. B. gefunden. In einer Probe (Nr. 49) war die Kultur nach Hohn positiv, nach Petroff hingegen negativ.
- c. Nach Petroff (mit 5 % H_2SO_4 (Vorbehandlung) und nach Hohn — 2. In allen Kulturen ergaben sich positive Resultate.
- d. Nach Hohn — 7. Alle Kulturen ergaben positive Befunde.
- e. Nach Hohn und mit dem Tierversuch — 1. Es wurden in der Kultur und bei der Sektion T. B. gefunden.

II. Von den 31 mikroskopisch negativen Proben ergaben die Züchtungsmethoden (nach Petroff und nach Hohn) — 14 positive und 17 negative Befunde, und zwar wurden geprüft:

- a) nach der Methode von Petroff (mit 10 % H_2SO_4 Vorbehandlung) 1 Kultur positiv und 3 — negativ.
Von diesen 3 negativen Proben ergab sich in einem Fall (Nr. 93) beim Tierversuch ein positiver Befund.
- b. nach demselben Verfahren (mit 5 % H_2SO_4 Vorbehandlung) 2 Kulturen positiv und 1 negativ.

- c. nach Hohn — 4 Kulturen positiv und 5 — négativ.
Von diesen 5 negativen Proben wurden in einem Falle (Nr. 107) beim Tiesversuch T. B. nachgewiesen.
 - d nach Hohn und mit dem Tierversuch — 1 Fall bei beiden Methoden positiv.
 - e. nach Hohn und nach Petroff (10 0/0 H₂ SO₄ Vorbehandlung) je 5 Kulturen bei beiden Methoden positiv und je 7 bei beiden Methoden negativ.
 - f. nach Hohn, nach Petroff und mit den Tierversuch — 1 Fall bei allen drei Methoden positiv und 1 Fall bei allen drei Methoden negativ. (s. Tierversuche):
- B. In den 8 klinisch zweifelhaften Fällen wurden sowohl im Ausstrich als mit dem Züchtungsverfahren keine T. B. nachgewiesen.
- C. In den 29 Fällen ohne klinisch nachweisbare Tuberkulose wurden in einem Falle (Urinsediment Nr. 14) im Ausstrich säurefeste Pazillen gefunden, dagegen fiel die Kultur nach Hohn negativ aus. Es handelte sich um Smegmabazillen.

Auf Grund dieser Ergebnisse kann man annehmen, dass beim negativen Ausstrich die Züchtungsmethoden nach Petroff und besonders nach Hohn zur Diagnose der Tuberkulose verwertbar und als Bereicherung der klinischen Mittel anzusehen sind. Das Tier bleibt aber bis jetzt das empfindlichste Reagens für den Tuberkelvirus und daher entscheidend für die Diagnose.

Zum Schluss sei es mir gestattet, meinem hochwerten Lehrer, Herrn Professor Dr. R. Massini, für das gütige Ueberlassen des interessanten Themas sowie für das grosse Interesse und die freundliche Unterstützung bei der Arbeit meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Literaturverzeichnis

- | | |
|--------------------------|--|
| Engel W | deutsche Med. Woch. 1926, No. 24. S. 1001, |
| Hauptmann & Burlschr | Wien. Kl. Woch. 1928, No. 3 S. 87. |
| Herrmann E. | Centr. f. Bakt. 1. Abtlg. Bd. 102, 1927, S. 169. |
| Hohn | Centr. f. Bakt. 1. Abtlg. Bd. 98, 1957. S. 465. |
| | München Med. Woch 1926, No. 51, S. 2172. |
| Isabolinsky & Gitowitsch | Zentr. f. Bakt. 1. Abtlg. Bd. 94. S. 271. |
| Keilty | Journ. of Exper. Med. 1915, Vol. 23, No. 5, p. 162 |
| Læwenstein | Wien, Klin. Wochen. 1924. |
| | Wien. Klin. Wochen. No. 5, S. 155, 1927. |
| Meller R. | Zeitschr. f. Tuberk, Bd 48, H. 2. 1927. |
| Mitschel & Timons | Journ. of Amer. Med. Assoc. 1915, Vol. 215 p. 245 |
| Petroff | Jour. Experim. Med. Vol. 21, 1915 p. 38. |
| | Zeitschr. f. Tuberk. Bd. 24, H. 41, S. 263 |
| Pesch & Simchowitsch | München. med. Woch. S. 1592. 1925. |
| Schmidt Fr. | Zentr. f. Bakt. 1. Abtlg. Bd. 101, S. 346, 1927. |
| Schrader G. | Med. Kl. No. 22, S. 838, 1927. |
| | Zentr. f. Bakt. 1. Abtlg. Bd. 102, S. 163. |
| Sonnenschein | M. Med. Woch. No. 56, S. 1549 1927. |
| Sütterlin Th. | M. Med. Woch. No. 2, S. 1180, 1927. |
| Sumiocyhi | Zeisch. f. Tuberk. 39, 5 und 40 5 1924. |
| Su'anyi et Putnoky | Zentr. f. Bakt. 1. Abtlg. Bd. 94, S. 401. |
| Wise & Farnbich | Klinische Wochenschrift S 2250. 1925. |
| Zechnowitz | Zentr. f. Bakteriologie, 1 b 94 S 246, 1925, |
| Dimtza | Archiv. f. Klin, Chirurgie bd 150 S, 646. 1928, |

